

nej grupie pacjentów z ZZA nie znaleziono również korelacji między głębokością uzależnienia a sposobem picia.

4. Uzyskane wyniki nie pozwalają również na stwierdzenie korelacji między głębokością uzależnienia a obciążeniem ZZA i początkiem uzależnienia.

5. W badanej grupie osób uzależnionych stwierdzono natomiast korelację między początkiem uzależnienia i obciążeniem ZZA, tzn. pacjenci z wczesnym początkiem choroby byli częściej obciążeni ZZA aniżeli badani z późnym początkiem uzależnienia.

6. Pacjenci z ZZA badani po detoksykacji wykazywali miernie nasilone objawy depresyjne, nerwicowe oraz podwyższony poziom lęku.

Clinical pattern and the course of the alcohol dependence syndrome (ADS)

Summary

The study was aimed at a comparative analysis of the ADS in 82 cases. The following patient groups were distinguished: a/ with ADS cares in the family, b/ with an early onset of the dependence, and c/ with severe dependence. Interviews and clinical scales (including BPRS, the Hamilton Depression Scale, STAI) were used in the study. Generally, drinking pattern i.e. the duration of drinking bouts, abstinence periods, occurrence of alcoholic psychoses, were found to be independent of either the ADS in the family history or the age at the onset of dependence. On the other hand, withdrawal symptoms intensity was significantly higher in patients characterized by an early onset, encumbrance with the ADS and severe dependence.

tłumaczyła Barbara Mroziak

Bibliografia:

- 1. Buydens-Branchey L., Branchey M. H., Noumair D.: *Age of Alcoholism Onset. I. Relationship to Psychopathology*. Arch. Gen. Psychiat. 1989, 46, 225-230.
- 2. *DSM III. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux*.