

zwrócić uwagę, że u większości respondentów występowały wielotygodniowe ciągi codziennego spożywania alkoholu. Trudno więc stwierdzić czy część z zachowań określanych przez respondentów jako "po alkoholu" nie miała w rzeczywistości miejsca w okresie rozpoczynających się objawów abstynencyjnych. Jak wiadomo w zaawansowanym alkoholizmie objawy te mogą wystąpić już po zmniejszeniu dziennej dawki alkoholu. Taki rozpoczynający się zespół abstynencyjny może precypitować zwłaszcza reakcje depresyjne i zachowania samobójcze.

Aggression, attempted suicide, selfdestruction and alcohol dependence.

Summary

The collected data referring to a group of 80 patients (males) admitted to psychiatric ward have been analysed with the aim to find relation between level of dependency on one hand and aggressive behavior, attempted suicides and selfdestructive behavior on the other. It has been found that higher level of alcohol dependency corresponds with greater frequency of self-destructive behaviors ($p \ll 0,01$). No correlation has been found between intensity of alcohol dependence and attempted suicides as well as aggressive behaviours. The relation has been found between neurotical symptoms and juvenile non adjustment behaviors (present before initiation with alcohol) on one hand and suicidal attempts, self-destructive behaviors ($p \ll 0,01$), as well as aggression ($p \ll 0,05$) of dependants on the other. It suggests that personality traits preceding initiation with alcohol are responsible for aggression and self-destructive behavior of alcoholics rather than the dependence itself.

Bibliografia:

- 1. Berner P., Lesch O. M., Walter H. - *Alcohol and depression* Psychiatrische Universitatsklinik, Wien, Austria
- 2. Kornacki L., Ciupak A. - *Ocena*