

psychoz alkoholowych jest to jedyna okazja do zetknięcia się z ruchem AA. Z naszej analizy wynika, że każdy, nawet krótkotrwały kontakt z AA ułatwia uzyskanie wglądu i stwarza szansę na pełne podjęcie oferty AA w przyszłości.

SUMMARY:

„Factors involved in making psychiatric inpatients participate in AA meetings”.

In June 1991 it was decided to invite alcoholics – admitted to psychiatric ward mostly because of psychotic condition – to take part in AA meetings organized once a week. The ward is a sectorized unit for adults of both sexes and admits about 80 alcoholics yearly. For 79 out of 103 patients who between June 1991 and November 1992 got the offer of participation it was the first AA meeting ever attended. During 3 months following the discharge from the ward 36 patients (35%) attended at least two meetings, 11 patients (10,2%) participated only in one and 56 (54,4%) never attended any. Following factors were found to be connected with positive response to the invitation to AA meetings: some insight into one's own alcohol problem, previous contact with treatment center for alcoholic and existence of support system within the family. The response to the invitation was below expectation but the possible explanation might be patients preference for attending AA meetings at other places in town while already outside the ward.

ANEKS.

Zestawienie czynników środowiskowych.

1. Dane o środowisku społecznym pacjenta:

- posiadanie żyjących rodziców
- posiadanie współmałżonka
- czas trwania małżeństwa
- poprzednie związki małżeńskie
- posiadanie dzieci
- wychowywanie dzieci
- ograniczenie praw rodzicielskich