

dla woj. legnickiego i 10,2 dla woj. zielonogórskiego. W 1991 r. utrzymywała się taka sama kolejność województw, lecz liczby były wyraźnie niższe (odpowiednio: 8,1, 4,7 i 3,8; woj. warszawskie – także 3,8). Reasumując można stwierdzić, że uzyskane w przedstawiony tu sposób dane o zachorowaniach na AIDS i zakażeniach HIV mogą wskazywać na pewną stabilizację ilościową w zakresie sytuacji epidemiologicznej. Jednak nadal zaznaczają się niekorzystne zjawiska m.in. w postaci: występowania nowych, dość licznych zakażeń wśród narkomanów, braku poprawy sytuacji wśród homo – i biseksualnych mężczyzn czy rodzenia się dzieci z przeciwciałami anty-HIV w rodzinach narkomańskich.

Wanda Szata

HIV infection and AIDS in Poland: 1985 – 1992

HIV penetration and spreading among intravenous drug users (ivdus) – probably in 1988 – was turning point in HIV infections/AIDS cases epidemiological situation in Poland. Since then, some important changes have been observed, mainly: visible increasing of number HIV – infected persons and ivdus percentage among HIV – infected, growing frequency of HIV – infections among ivdus, the change of F: M sex ratio among HIV – infected, increasing number of young people among HIV – infected, AIDS appearance not only among homo – bisexuals, infected by heterosexual contact, but also among ivdus.

Last years has been noticed quantitative stabilization, but some unfavourable occurrences permanently exist, e.g.: new HIV infections among ivdus, the same – as previous years situation among homo-/bisexual men and child-bearing with the presence of HIV-antibodies.

PIŚMIENIICTWO

- 1 AIDS surveillance in Europe, Quarterly report, 1991, 32, 4a. –
2. Aids surveillance in Europe, Quarterly report, 1992, 34, 5. –