

Jeśli chodzi o działania profilaktyczne wobec innych, to osoby zakażone HIV twierdziły, że nie udostępniają nikomu własnych igieł i strzykawek, a jeśli to robią, to pod presją i zawsze informują o zakażeniu.

Generalną zasadą, choć nie zawsze przestrzeganą, staje się niedzielenie się z innymi swoim sprzętem do zastrzyków, co dawniej było bardzo popularne i należało do rytuału wśród młodzieży nadużywającej środki odurzające w zastrzykach.

Sfera życia seksualnego stanowiła w przekonaniu pacjentów jakby mniejsze zagrożenie zakażeniem HIV niż używanie środków odurzających w zastrzykach. Wydaje się, że składałyby się na to dwie przyczyny: znaczne obniżenie potencji w okresie dłuższego i częstego przyjmowania dużych ilości opiatów i innych substancji odurzających oraz zwyczajowa u nas niechęć do stosowania prezerwatyw i niski poziom kultury w sferze życia seksualnego. Niektórzy pacjenci byli nawet przekonani, że prezerwatywy jeszcze bardziej obniżają u nich i tak niską potencję. Osoby zakażone HIV nawiązywały chętnie między sobą stałe kontakty seksualne, gdyż w tym układzie czuły się bezpieczne i znajdowały wzajemne zrozumienie.

Podsumowanie

Badaną grupę – 115 pacjentów uzależnionych od opiatów leczoną metadonem charakteryzowało:

1. Wieloletnie używanie dożylnie opiatów oraz innych substancji uzależniających, takich jak benzodwuzepiny (głównie relanium), barbiturany (cyklobarbitol) i ostatnio amfetaminy (średni czas nadużywania opiatów wynosił około 13 lat).
2. Brak efektów leczenia metodami dotychczas stosowanymi mimo wielokrotnego ich podejmowania.
3. Pogorszenie się stanu zdrowia w związku z nadużywaniem środków odurzających (opiatów) stosowanych dożylnie w znacznych ilościach.
4. Nasilenie się zachowań niepożądanych społecznie i związanych z narkomanią, takich jak:
 - dezorganizacja życia rodzinnego i jego rozpad,
 - wysokie wskaźniki przestępczości związane z narkomanią (38% karanych),
 - bardzo słaba aktywność zawodowa mimo wieku produkcyjnego (tylko 13,4% zatrudnionych na stałe).
5. Ryzykowne zachowania powodujące zagrożenie rozpowszechnienia zakażeń HIV. Zachowania związane z używaniem środków odurzających oraz zachowania w sferze życia seksualnego.

Summary

One hundred and fifteen opiates dependent patients treated with methadone were surveyed. The employed questionnaire allowed to collect data regarding the social and health conditions of the patients. The special attention was paid to the psychoactive substances dependency development and process.

The surveyed group consisted of 87 males (75,7%) and 28 females (24,3%).

The respondents may be characterized as individuals:

- a) who, for many years and in the systematic way abused intravenously injected opiates and other dependency generating drugs (benzodiazepin, barbiturans, and recently amphetamine) for the average period of approximately 13 years,
- b) were previously treated with no success, despite the multiple treatments,
- c) whose health deteriorated because of the chronic abuse of the psychoactive substances (opiates),
- d) increasing intensity of socially unaccepted behavior, which could be attributed to the drug abuse, such as:
 - disorganization of family bonds and family breakup (20,9% individuals were divorced),
 - high values of the drug abuse related delinquency indicators (38% individuals had criminal records),
 - low level of productive activity, despite their productive age (only 13,4% were permanently employed).