

truje się wśród kobiet o niższym poziomie podstawowych czynników statusu społecznego, jakimi są wykształcenie i dochody.

Wnioski

Wyniki badania potwierdziły znaczne rozpowszechnienie używania przez kobiety w wieku 35 - 64 lata leków uspokajających i nasennych, a także tabletek od bólu głowy. W tej grupie dominują benzodiazepiny, a przede wszystkim relanium. Poziom rozpowszechnienia tych leków zbliża nasz kraj do krajów zachodnich. Obserwujemy też w naszym kraju podobne procesy jak w tamtych krajach. Rozszerza się oferta legalnych leków psychoaktywnych, nasila się ich reklama, powstaje tendencja do radzenia sobie z różnymi problemami i kłopotami życia codziennego przy użyciu pigułki. Podjęcie działań profilaktycznych wydaje się zatem uzasadnione.

Janusz Siersławski

The Use of the Addictive Drugs by Women

The questionnaire survey on the use of the addictive drugs by women, at the age of 35 through 64 years was completed in the summer 1992.

The inquiry was conducted on the quota sample consisting of one thousand individuals, by female interviewers using the interview questionnaires. The sample was selected on the ground of the results of the former study, which revealed the relatively highest epidemiological risk in this group. The survey constituted the primary step of the prevention program. The results of the survey confirmed the significant dissemination of the psychoactive drug use among women. During the twelve months preceding the survey, 25% of the surveyed women used benzodiazepines and about 6% without a physician recommendation. Relanium is most popular tranquilizer. The use of the headache pills is even more widespread. Over 30 days preceding the survey, they were used by 34% of the respondents. This group includes the 12% faction of respondents, who used headache pills over at least 10 days, during the last month. Coping with this type discomfort by using the headache pills is more frequent among females of lower social status components, such as education and income.