

będzie dalej analizowany, z uwzględnieniem zarówno współwystępowania kilku objawów jak i częstotliwości ich doświadczania.

Na podstawie wstępnej analizy wyników można stwierdzić, że:

1. Badanie ujawniło, iż większość wymienionych w badaniu dolegliwości jest doświadczana przez liczną grupę respondentek częściej niż 10 razy w miesiącu, co niesie ze sobą zwiększone ryzyko nadużywania leków.
2. Wśród sposobów radzenia sobie z poszczególnymi dolegliwościami przyjmowanie leków wymieniane jest często.
3. Grupa kobiet nie doświadczających żadnych dolegliwości lub wymienających nie więcej niż dwie jest zdecydowanie mniejsza od grupy tych, które w ostatnim miesiącu doświadczyły 6-ciu lub więcej spośród wymienionych w ankiecie objawów.
4. Materiał wymaga dalszych analiz statystycznych, na obecnym etapie wszelkie operacyjne projekty działań profilaktycznych są przedwczesne.

Summary

Drug abuse, not only in Poland, but also in many other countries is perceived in a narrow perspective of the opiate dependence. There is a common belief that drug dependence is limited to the youth only. The hidden problem of drug abuse by the adult population, especially by middle-aged women, has not received sufficient attention so far. The article discusses selected aspects of this issue. From the primary prevention perspective, the most likely future consumers of psychoactive drugs could be found among those who suffer psychosomatic troubles. Prevalence of these complications as well as an attempt to assess the proportion of risk group among female population in Poland are presented.

Piśmiennictwo

1. Cappell H.D. & Basto U. (1986): Benzodiazepines as drugs of abuse and dependence. W: Alcohol and Drug Problems 9, 53-126.
2. Colten M.E. & Marsh J.C. (1984): A sex role perspective on drugs and alcohol use by women. W: Sex Roles and Psychopathology, ed. Cathy Spatz Widom. New York: Plenum Press, 219-248.