

blemy w kontaktach z innymi ludźmi, zaburzenia życia rodzinnego, problemy finansowe, konflikty z prawem, stosowanie przemocy i inne. Zatem utrzymywanie abstynencji lub picie rzadziej i w sposób mniej destrukcyjny niż przed terapią winno, przynajmniej do pewnego stopnia, pociągać za sobą zmniejszenie nasilenia problemów społecznych. Ponadto, w ramach terapii, pacjenci pracują nad swoimi problemami w relacjach z najbliższymi oraz w relacjach z innymi ludźmi, co także sprzyja rozwiązywaniu przez nich wymienionych wyżej problemów społecznych. Wydaje się zatem, że dla tych pacjentów, którzy ukończyli PPTU i o których funkcjonowaniu społecznym mamy pełne dane, można mówić o poprawie funkcjonowania społecznego dzięki terapii odwykowej.

Wnioski

W grupie uzależnionych pacjentów placówek odwykowych Sieci, którzy ukończyli podstawowy program terapii uzależnień i o których mamy pełne dane z wszystkich etapów monitorowania, znacznie zmniejsza się nasilenie problemów społecznych, takich jak problemy w pracy, problemy w kontaktach z innymi ludźmi, zaburzenia życia rodzinnego, problemy finansowe, konflikty z prawem, stosowanie przemocy i inne.

Największe zmiany występują w zakresie zaburzeń życia rodzinnego.

Streszczenie

Spośród ogółu pacjentów uzależnionych monitorowanych w Sieci Wiodących Placówek Lecznictwa Odwykowego wyodrębniono podgrupę pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii uzależnień (PPTU), przeszli pełny program monitorowania i dysponowano pełnymi danymi o nich z wszystkich jego etapów (na początku terapii, po zakończeniu PPTU, oraz pół roku, rok i dwa lata po zakończeniu PPTU) w zakresie ich funkcjonowania społecznego w tym czasie. Uzyskane rezultaty wskazują na znaczną poprawę funkcjonowania społecznego tych pacjentów: zmniejszenie nasilenia problemów w pracy, problemów w kontaktach z innymi ludźmi, zaburzeń życia rodzinnego, problemów finansowych, konfliktów z prawem, stosowania przemocy i innych problemów.

Jerzy Mellibruda, Bogusław Włodawiec

Changes in social functioning of the APETA program participants after alcohol treatment

Summary

From the monitored patient population a subgroup was distinguished of those who had finished the basic alcohol treatment program (BAT) and on whose social functioning complete data were available across the monitored period, i.e.

on pre-treatment baseline, on the treatment completion, and at 6-, 12- and 24-month follow-ups. Obtained data indicate a considerable improvement in these patients' social functioning, i.e. a decline in severity of their problems in various areas: at work, in interpersonal communication, in family life, financial standing. Conflicts with the law, violence use and other problems were also found to be less marked in this group.

Key words: alcoholism / social functioning / alcohol treatment