

na skuteczność terapii współzależnienia w Sieci Wiodących Placówek Lecznictwa Odwykowego.

Streszczenie

Przedstawiono dane demograficzne grupy współzależnionych pacjentek placówek Sieci Wiodących Placówek Lecznictwa Odwykowego w Polsce i wyniki badań kwestionariuszami: SCL-90, KKP, SOC-29, TISCO, BAW, Skala Bradburna i kwestionariuszem „Moje Przekonania”. Stwierdzono, iż w porównaniu do ogółu polskiej populacji stosunkowo wysoki odsetek badanych kobiet jest rozwiedzionych lub w separacji, ma wykształcenie co najmniej średnie i mieszka w miastach. Prawie połowa badanych wychowywała się w rodzinie, w której ktoś nadużywał alkoholu. Poczucie koherencji badanej grupy było najniższe ze wszystkich dotychczas badanych grup. Wyniki niektórych testów w podgrupie kobiet rozpoczynających terapię oraz w podgrupie kobiet kończących terapię istotnie się różniły. Różnice te były zgodne z oczekiwaniami i zdają się potwierdzać efektywność terapii współzależnienia w placówkach Sieci.

Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda, Bogusław Włodawiec
Results of a pilot study of the APETOW program - characteristics of co-dependent female patients

Summary

The paper presents sociodemographic characteristics of a group of co-dependent women treated in the Alcohol Treatment Network facilities in Poland. Moreover, data obtained from this group by means of a number of questionnaires (SCL-90, KKP, SOC-29, TISCO, BAW, the Bradburne Scale, and „My Beliefs” questionnaire) are presented. As compared to the general population of Poland, a relatively large percent of the study participants turned out to be divorced or separated, had at least a secondary education, and lived in an urban area. Almost a half of them were brought up in a family with an alcohol abuser. The sense of coherence was the lowest in this group as compared to all other groups examined to date. There were significant differences in scores on some scales between women beginning treatment and those who had completed therapy. The differences were in accordance with expectations and seem to confirm co-dependence treatment efficacy.

Key words: co-dependent women / evaluation of therapeutic program / sense of coherence / psychopathological symptoms / affective balance