

2. W badanej populacji kobiet u 31% stwierdzono palenie papierosów w czasie trwania ciąży. Wśród kobiet niepalących papierosów w czasie ciąży w porównaniu z kobietami je palącymi, więcej jest kobiet zamężnych oraz czynnych zawodowo. Kobiety nie palące papierosów w trakcie ciąży w porównaniu z kobietami je palącymi są lepiej wykształcone.

### Streszczenie

Celem badań była ocena rozpowszechnienia picia alkoholu i palenia papierosów wśród kobiet ciężarnych. Badania przeprowadzono u 205 losowo wybranych ciężarnych kobiet leczących się w 5 poradniach K, działających w rejonie położniczym szpitala miejskiego w Bydgoszczy oraz u 1623 ciężarnych kobiet przebywających w szpitalu miejskim w Bydgoszczy. U wszystkich badanych przeprowadzono ustrukturalizowany wywiad dotyczący danych demograficznych, klinicznych oraz picia alkoholu i palenia papierosów w czasie obecnej ciąży i okresie ją poprzedzającym.

Picie alkoholu w czasie trwania ciąży podawało 35% badanych kobiet. Kobiety pijące alkohol podczas ciąży miały średnio wyższy poziom wykształcenia niż kobiety niepijące.

Palenie papierosów w czasie trwania ciąży podawało 31% badanych kobiet. Wśród kobiet palących papierosy podczas ciąży mniejszy był odsetek kobiet zamężnych i zatrudnionych, w porównaniu z kobietami niepalącymi. Kobiety palące papierosy podczas ciąży miały średnio wyższy poziom wykształcenia niż kobiety niepalące.

Marcin Ziółkowski, Janusz Rybakowski, Jarosław Szulczyński,  
Jarosław Lach, Ewa Lach

**Alcohol drinking and cigarette smoking in pregnant women**

### Summary

The aim of the study was to assess alcohol drinking and cigarette smoking prevalence among pregnant women. Participants in the study 1623 pregnant female inpatients of the city hospital in Bydgoszcz, and 205 randomly selected pregnant women attending 5 outpatient obstetric clinics located in the catchment area of same hospital. In each case a structured interview was carried out, covering demographic and clinical data as well as these on alcohol drinking and cigarette smoking during this pregnancy and in the preceding period. Alcohol drinking was reported by 35% of respondents. Women drinking alcohol during pregnancy had on average a higher education level than those who did not drink. Cigarette smoking was reported by 31% of women under study. The percentage of the married and employed was lower among pregnant smokers as compared to non-smokers. Women smoking during pregnancy had on average a higher education level than had non-smokers studied.

**Key words:** pregnancy / smoking / alcohol drinking