

## Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików

Risk factors for child development in families  
with the alcohol-related problems  
The example of Adult Children of Alcoholics

**Krzysztof Gąsior**

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce  
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce

**Abstract – Introduction.** The study aims at testing the relationships between family-of-origin disfunctions and selected aspects of the psychosocial functioning, as well as mental disorders of Adult Children of Alcoholics (ACA).

**Method.** The following instruments were used for this study: a biographic questionnaire, Costa and McCrae's NEO-FFI personality test, Popielski's Noo-dynamics Test, Antonowski's Practical Orientation Questionnaire (SOC-29), Endler and Parker's Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), Derogatis, Lipman and Covi's outpatient psychiatric rating scale (Symptom Checklist, SCL-90). The study group includes 61 subjects participating in ACA therapy (average age 27 years). Statistical analyses include the factor analysis and the correlation analysis.

**Results.** The degree of family-of-origin disfunctions influences the magnitude of mental disorders and psychosocial problems of ACA, more precisely – the domination of a drinking person in family, use of violence, bad and conflict loaded atmosphere at home, lack of maternal care (mother's impulsiveness and emotional instability), lack of parental care in difficult and threatening situations to which the children are exposed.

**Key words:** Adult Children of Alcoholics, parental alcohol abuse, predictors of psychopathology

**Streszczenie – Wprowadzenie.** Celem badań było zweryfikowanie związków zachodzących między dysfunkcjonalnością rodziny pochodzenia a wybranymi aspektami funkcjonowania psychospołecznego i objawami zaburzeń psychicznych u Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

**Metoda.** W badaniach zastosowane zostały: ankieta życiorysowa, test osobowości NEO-FFI Costy i McCrae, Test Noo-dynamiki Popielskiego, Kwestionariusz Orientacji Życiowej Antonowskiego (SOC-29), Inwentarz Stylu Radzenia sobie ze Stressem (CISS) Endlera i Parkera, Skala Klinicznych Objawów Psychopatologicznych (SCL-90) Derogatis, Lipman i Covi. Badana grupa liczyła 61 osób korzystających z terapii dla DDA (średnia wieku wynosiła 27 lat). Do opracowania statystycznego zastosowano analizę czynnikową i analizę korelacyjną.

**Wyniki.** Stopień dysfunkcjonalności rodziny pochodzenia wpływa na nasilenie zaburzeń psychicznych i problemów psychospołecznych u DDA. Ważne są tu przede wszystkim następujące czynniki: