

Zaburzenie stresowe pourazowe u kobiet jako wynik przemocy ze strony partnera

Posttraumatic stress disorder among women as a consequence of intimate partner violence

Małgorzata Dąbkowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Psychiatrii

Abstract – Introduction. Previous research has demonstrated a strong association between intimate partner violence (IPV) and mental health symptoms. Women much more often than men experience physical violence from their partners and more frequently are victims of systematic, long-term harassment. This study highlights the incidence of posttraumatic stress disorder (PTSD) among women who had experienced violence from a life partner.

Method. The women's level of posttraumatic stress was assessed using part 3 of the Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS) 17-item questionnaire, that distinguishes three categories of symptoms associated with PTSD: re-experience, avoidance, and hyperarousal. The Posttraumatic Diagnostic Scale is a self-report instrument for PTSD that is simple to administer and has demonstrated good psychometric properties. The study group consisted of 34 women aged between 19 and 68 years who were victims of partner violence.

Results. Most women (76%) who were victimized showed a moderate to severe or severe increase of PTSD symptoms. Nearly half of them (47%) represented a subtype of delayed-onset of PTSD, 56% – reported symptoms of malfunctioning in various domains of everyday life.

Conclusions. Victims of interpersonal violence are inherently at risk of PTSD. The onset of PTSD related to domestic violence could be delayed. Symptoms of PTSD are correlated with the level of impairment in many domains of life.

Key words: intimate partner violence, mental health, posttraumatic stress disorder

Streszczenie – Wstęp. Jak wynika z badań istnieje silna zależność między przemocą ze strony partnera a pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego ofiary. Kobiety są, częściej niż mężczyźni, ofiarami przemocy fizycznej ze strony partnerów oraz są niejednokrotnie poddawane systematycznym, długofalowym prześladowaniom. W niniejszym badaniu ocenia się obecność objawów zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) u kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony partnera.

Metoda. Nasilenie objawów zaburzenia stresowego pourazowego oceniano za pomocą trzeciej części Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS), składającej się z 17-punktowego kwestionariusza