

Leczenie zakażenia HIV u osób używających narkotyków w iniekcjach Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia publicznego

Antiretroviral therapy of injecting drug users
Proposals of systemic solutions in public health perspective

Maria Brodzikowska, Sylwia Opozda-Suder

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki, Kraków

Abstract – Injection drug using is one of the main factor affecting the course of the HIV/AIDS epidemic in the world causing about 10% of all infections per year. In this context, a major issue is the availability of antiretroviral (ARV) treatment for this group of patients. In fact, in many regions of the world treatment is often withheld from HIV-infected addicts based on the erroneous assumption that it would be bound to be ineffective due to their lifestyle and life situation. The aim of this article is to develop model solutions for the Polish public health services, which allow for treatment of these patients with antiretroviral drugs adopting similar standards of conduct as practiced with other patient groups with infectious diseases.

Solutions suggested here are based on the model of directly administered antiretroviral therapy (DAART) and allow for the organization of a holistic care system catering to addicts. As part of this system, addiction is treated as a health problem and consequently injection drug users cannot be denied treatment and care. What is more important addicts can achieve as good results in the antiretroviral therapy as other people living with HIV/AIDS.

However, the implementation of such solutions contingent upon a shift from a drug-free paradigm to a broader range of interventions, including Opioid Substitution Therapy as an equal form of treatment. It provides opportunities for addicts to receive comprehensive care offered by interdisciplinary team of specialists, including support complying with ARV therapy, which will improve the effectiveness of treatment on HIV infection in this population, according to standards proposed in this article.

Key words: injection drug using, Opioid Substitution Therapy, HIV infection, Antiretroviral Therapy, adherence

Streszczenie – Iniekcyjne używanie narkotyków jest jednym z głównych czynników wpływających na obraz epidemii HIV/AIDS na świecie, gdyż tą drogą dochodzi do około 10% wszystkich zakażeń rocznie. W tym kontekście zasadniczą kwestią staje się problem dostępności leczenia antyretrowirusowego dla tej grupy pacjentów. W wielu regionach globu osobom uzależnionym zakażonym HIV odmawia się terapii przeciwwirusowej ze względu na mylne przekonanie, iż z uwagi na ich styl funkcjonowania i sytuację życiową nie przyniesie ona pożądanych rezultatów. Celem niniejszego artykułu jest zatem zaproponowanie modelowych rozwiązań na gruncie zdrowia publicznego w Polsce, które pozwolą na leczenie antyretrowirusowe tych pacjentów, z przyjęciem standardów stosowanych przy leczeniu innych grup pacjentów z chorobami zakaźnymi.